

Weitere Informationen

www.aids.ch

Alles, was Sie zum Leben mit HIV wissen müssen, und wo Sie Beratungsstellen finden.


www.drgay.ch

Informationen und Beratung für Männer, die Sex mit Männern haben.

Dieses Faltblatt wurde von der Aids-Hilfe Schweiz in Zusammenarbeit mit **NAM Aidsmap UK** produziert. Wir empfehlen Ihnen, die darin enthaltenen Informationen mit einer medizinischen Fachperson zu besprechen.


HIV+

HI-Viruslast unter der Nach- weisgrenze




Wenn die Virusmenge im Körper sehr klein ist, kann man sie nicht mehr nachweisen. HIV ist dann unter Kontrolle. Wenn Sie die Medikamente weiterhin nehmen, können Sie das Virus nicht mehr weitergeben.

Das Ziel der HIV-Behandlung ist eine sehr kleine Virusmenge im Körper. Tests zeigen dann kein HIV mehr an, die Viruslast ist unter der Nachweisgrenze.




1

Die Messung der Viruslast zeigt, wie viel HIV sich in einem Tropfen Blut befindet.



2

Das Resultat zeigt, ob die HIV-Menge im Blut hoch oder niedrig ist.



3

Wenn die Virusmenge sehr niedrig ist, spricht man von einer nicht nachweisbaren Viruslast. Die Virusmenge in der Blutprobe ist so gering, dass man kein HIV mehr sehen kann.



4

Das bedeutet nicht, dass HIV aus dem Körper verschwunden ist. In anderen Teilen des Körpers, zum Beispiel im Darm, kann das Virus noch vorhanden sein.



5

Es heisst, dass HIV unter Kontrolle ist.



6

Wenn Sie die Medikamente regelmässig nehmen, können Sie das HIV nicht weitergeben.