

LES RÈGLES D'OR POUR LE CLIENT DU PLAISIR

— 1 —

CONCLUS DES
ARRANGEMENTS CLAIRS

— 2 —

N'ATTENDS PAS TROP
DE LA RELATION

— 3 —

SOIS UN CLIENT QUE L'ON
A PLAISIR À VOIR

— 4 —

UTILISE TOUJOURS
UNE CAPOTE

Informations supplémentaires, adresses des centres
de test/conseil:
www.don-juan.ch / www.lovelife.ch



1ère édition, 2015
© SANTÉ SEXUELLE Suisse
Avec le soutien de l'Office fédéral de la santé publique OFSP
Graphisme: Gerhard Blättler, Berne /
Impression: Werner Druck & Medien, Bâle
Commandes: www.sante-sexuelle.ch/shop

Ce dépliant t'est offert par :

LE SEXE TARIFÉ NE DOIT PAS TE COÛTER LA SANTÉ

— WWW.DON-JUAN.CH —

1

CONCLUS DES ARRANGEMENTS CLAIRS

Explique clairement la prestation que tu veux et demande quel en est le prix. Chaque prostituée a ses limites et a le droit de dire non. Tiens-toi à ce qui a été convenu entre vous et sois aimable.

2

N'ATTENDS PAS TROP DE LA RELATION

Ce n'est pas une histoire d'amour. Même si le rapport très agréable, il reste professionnel. Il peut aussi parfois y avoir des ratés. Garde la tête froide et ne réclame jamais ton argent en retour. La colère ou une dispute peut rapidement t'attirer des ennuis. Cela ira mieux une autre fois, avec une autre femme.

3

SOIS UN CLIENT QUE L'ON A PLAISIR À VOIR

Ne vas pas chez une prostituée en étant ivre et comporte-toi correctement. La prostituée te servira d'autant plus volontiers.

4

UTILISE TOUJOURS UNE CAPOTE

Les prostituées couchent avec toutes sortes d'hommes différents. Le risque de transmettre des maladies est donc d'autant plus grand – des clients aux prostituées et des prostituées aux clients.

- Utilise toujours un préservatif pour les relations vaginales et anales.
- Pour les relations anales, lubrifie avec beaucoup de gel (à base d'eau).
- Si tu lèches les organes génitaux de la femme, recouvre son sexe avec un préservatif coupé ou une digue dentaire (Dental Dam).
- De nombreux agents pathogènes peuvent aussi se transmettre de la femme à l'homme et inversement par une fellation (pipe) sans capote ou par un cunnilingus sans protection.

Une prostituée qui propose ou accepte des relations non protégées ne le fait pas qu'avec toi. Protège-toi même si tu es un habitué et que tu connais et aimes bien la fille.



- Utilise des préservatifs portant le label de qualité ok et respecte la date de péremption. Le bon préservatif avec la bonne taille pour toi : www.mysize.ch
- Informations supplémentaires, adresses des centres de test/conseil : www.don-juan.ch / www.lovelife.ch

!

RESTE PRUDENT

Les infections sexuellement transmissibles ne sont souvent pas visibles et la santé d'une prostituée n'est pas contrôlée par l'Etat. Même une prostituée d'apparence soignée peut être porteuse d'une infection. Elle l'ignore peut-être elle-même.

!

QUE FAIRE SI LE PRÉSERVATIF ÉCLATE OU SE DÉCHIRE ?

Si le préservatif est abîmé, tu n'es plus protégé. Il est donc possible que tu t'infectes. Et tu peux toi aussi transmettre des infections, même si tu n'as aucun symptôme.

- Consulte le plus rapidement possible – le lendemain au plus tard – et informe-toi des mesures à prendre dans un tel cas www.don-juan.ch / www.lovelife.ch
- Utilise impérativement des préservatifs durant les trois mois suivants, aussi avec ton amie ou ta femme. C'est à toi qu'incombe la responsabilité de ne pas l'infester.
- Fais un test VIH, mais fais-toi conseiller au préalable.

!

RENDS-TOI SANS TARDER CHEZ LE MÉDECIN SI TU CONSTATES DES SYMPTÔMES!

Les troubles suivants peuvent être le signe d'une infection sexuellement transmissible :

- écoulement de la verge, de quantité et de couleur variable ;
- brûlures en urinant, démangeaisons dans la région de l'urètre ;
- douleurs et gonflements dans la région des testicules ;
- chancres, ulcères, vésicules, excroissances, rougeurs et démangeaisons au pénis ou aux testicules.

Une infection par le VIH (sida) ne se reconnaît pas aux symptômes susmentionnés. Souvent en effet, le début d'une infection par le VIH ne s'accompagne d'aucun signe, alors même qu'une personne nouvellement infectée peut être hautement contagieuse pendant cette phase. Ou alors il y a des symptômes, p. ex. fièvre, ganglions enflés, mal à la gorge, etc., mais qui font plutôt penser à une grippe. Seul un test VIH peut dire si tu t'es infecté ou non.

Important :

- Consulte un professionnel pour les questions de protection, vaccins, risques et tests.
- Fais-toi régulièrement tester si tu as souvent des contacts sexuels non protégés.
- Tu peux te faire conseiller et tester aussi sans donner ton nom.