

Maggiori informazioni

www.aids.ch

Tutto ciò che dovete sapere sul tema «Vivere con l'HIV» e su dove trovare i centri di consulenza.

www.drgay.ch

Informazioni e consulenza per uomini che fanno sesso con altri uomini.

Il presente dépliant è stato realizzato dall'Aiuto Aids Svizzero in collaborazione con **NAM Aidsmap UK**. Raccomandiamo di esaminare le informazioni riportate con un medico esperto.


HIV+

Carica virale HIV al di sotto della soglia di rilevabilità




Quando la quantità di virus è molto bassa, la carica virale non è più rilevabile. In tal caso l'HIV è sotto controllo. Se assumete i farmaci regolarmente, non potete più trasmettere il virus.

L'obiettivo della terapia contro l'HIV è ridurre al minimo la quantità di virus nel sangue. I test non rilevano più il virus HIV, la carica virale è al di sotto della soglia di rilevanza.




1

La misurazione della carica virale indica quanti virus HIV sono rilevabili in una goccia di sangue.



2

Il risultato indica se la quantità di HIV nel sangue è alta o bassa.



3

Quando la quantità di virus è molto bassa si parla di «carica virale non rilevabile». La quantità di virus HIV nel sangue è talmente bassa da essere trascurabile.



4

Ciò non significa che l'HIV è completamente scomparso dall'organismo. In altre parti del corpo, ad esempio nell'intestino, il virus può ancora essere presente.



5

Ciò significa che il virus HIV è sotto controllo.



6

Se continuate ad assumere i farmaci regolarmente, non potete più trasmettere il virus HIV.