


الحمل الفيروسي العالي ضمن حد الكشف



إذا كانت كمية الفيروس في الجسم قليلة جدًا، فلن تتمكن من اكتشافها. بعد ذلك، يصبح فيروس العوز المناعي البشري (HIV) تحت السيطرة. لن ينتقل الفيروس إذا واصلت تناول الأدوية.

www.aids.ch

إليك كل المعلومات اللازمة عن طريقة التعايش مع فيروس العوز المناعي البشري (HIV) وكيفية إيجاد مراكز الاستشارة المعنية.

www.drgay.ch

معلومات ونصائح للرجال المثليين الذين يمارسون الجنس مع رجال.

أعدت هذه النشرة من قِبل منظمة **Aids-Hilfe Schweiz** بالتعاون مع **NAM Aidsmap UK**. نوصي بمناقشة المعلومات المتضمنة في النشرة مع أخصائي رعاية صحية.

تبرعكم بمنحنا القدرة على العمل - كل الشكر والتقدير لكم! مؤسسة المساعدة في كفاخ مرض الإيدز، زيورخ، PC 30-10900-5 أو أوتلاين عبر الرابط spenden.aids.ch

يتمثل الهدف من علاج فيروس العوز المناعي البشري (HIV) في وجود كمية قليلة جداً من الفيروس في الجسم. وتظهر الفحوصات اللاحقة عدم وجود المزيد من فيروس العوز المناعي البشري (HIV) حيث يصبح الحمل الفيروسي ضمن حد الكشف.



1

يظهر قياس الحمل الفيروسي كمية فيروس العوز المناعي البشري (HIV) في قطرة دم.



2

تظهر النتيجة ما إذا كانت كمية فيروس العوز المناعي البشري (HIV) في الدم مرتفعة أم منخفضة.



3

إذا كانت كمية الفيروس منخفضة للغاية، يشير هذا إلى حمل فيروسي لا يمكن اكتشافه. تصبح كمية الفيروس في عينة الدم صغيرة جداً لدرجة أنه لن يعود بالإمكان رؤية فيروس العوز المناعي البشري (HIV).



4

وهذا لا يعني اختفاء فيروس العوز المناعي البشري (HIV) من الجسم. قد يظل الفيروس موجوداً في أجزاء أخرى من الجسم، على سبيل المثال في الأمعاء.



5

وهذا يشير إلى أن فيروس العوز المناعي البشري (HIV) تحت السيطرة.



6

لن ينتقل فيروس العوز المناعي البشري (HIV) إذا واصلت تناول الأدوية بانتظام.